

**AHAI « secondaires » : principales maladies ou circonstances pouvant être associées
aux AHAI à anticorps « chauds » :**

1. Hémopathies et maladies lymphoprolifératives*:
 - **Leucémie lymphoïde chronique**
 - Autres lymphomes malins non Hogkiniens de type B (lymphome de la zone marginale)
 - Leucémie aigue lymphoblastique B
 - Leucémie chronique à LGL (*large granular lymphocytes*)
 - Lymphadénopathie angio-immunoblastique
 - Lymphome de Hodgkin
 - Maladie de Castleman
 - Myélodysplasies
 - Myélofibrose

 2. Autres tumeurs :
 - Thymome
 - Kyste dermoïde de l'ovaire
 - Carcinomes

 3. Maladies auto-immunes ou inflammatoires
 - **Lupus systémique**
 - Syndrome primaire des antiphospholipides
 - Polyarthrite rhumatoïde
 - Rectocolite hémorragique, maladie de Crohn
 - Maladie de Biermer
 - Myasthénie
 - Hépatite auto-immune
 - Thyroïdites
 - Sarcoïdose
 - Fasciite de Shulman

 4. Infections :
 - Mononucléose infectieuse
 - Infection chronique par le VHC
 - Tuberculose
 - Brucellose
 - Syphilis

 5. Médicaments (17,18)

 6. Déficits immunitaires primitifs
 - **Déficit immunitaire commun variable**
 - ALPS** (*Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome*)
 - Syndrome IPEX** (*the Immune dysregulation Polyendocrinopathy Enteropathy X-linked syndrome*)

 7. Autres :
 - Grossesse
 - Histiocytose sinusale de Rosai-Dorfman
 - Post-allogreffe de moelle
-

Notes : En caractères **gras**, les causes les plus fréquentes dans chacune des catégories, * ces maladies concernent en grande majorité l'adulte, ** ces affections sont révélées quasi-exclusivement dans l'enfance.