CeReCAI
Centre De Référence
Cytopénies Auto-immunes
de l'Adulte

Tolérance et efficacité du fostamatinib comme traitement du PTI associé à un SAPL et/ou une connectivite

Connect-Syk

E Crickx, Créteil
Octobre 2025

Contexte

- Peu de données sur l’utilisation du fostamatinib dans les PTI secondaires à une connectivite ou SAPL

- Intérêt potentiel sur:
  - le risque thrombotique en cas de SAPL
  - le risque infectieux (surtout si exposition préalable IS)
  - l’évolution de la connectivite (si symptômes associés) ?

Objectifs

Objectif principal :

1. Décrire la sécurité d'utilisation en vie réelle du fostamatinib pour un PTI secondaire à une connectivite et/ou à un SAPL.

Objectifs secondaires :

1. Décrire la réponse au traitement par fostamatinib en vie réelle pour un PTI secondaire à une connectivite et/ou à un SAPL.
2. Décrire l'évolution de la maladie associée sous fostamatinib

Critères d'inclusion

- Patient adulte ≥ 18 ans
- **PTI** selon les critères internationaux
- Initiation d'un traitement par **fostamatinib** (TAVLESSE) pour le PTI

- Un des diagnostics suivants :
- **SAPL** (primaire ou secondaire) selon les critères de Sapporo 2006
- **Lupus systémique** selon les critères ACR/EULAR 2019
- **Syndrome de Sjögren** selon les critères ACR/EULAR 2016
- **Sclérodermie systémique** selon les critères ACR/EULAR 2013
- **Connectivite mixte** selon les critères de SHARP 1987
- **Connectivite indifférenciée** : aucun des critères précédents et présence de manifestations autoimmunes attribuées à une connectivite par le clinicien

Avancement octobre 2025

Appel à observation CERECAI (n=25)

Carmen France (n=12)

37 patients identifiés

Exclus (n=4)

33 patients incluables

24 SAPL
9 Lupus systémiques
4 maladies de Sjögren
1 Sclérodermie
1 PR

20 CRF remplis…

- **Contact investigateurs :**
  Dr Etienne Crickx
  etienne.crickx@aphp.fr

  Dr Hortense Chassepot
  hortense.chassepot@aphp.fr

  Hôpital Henri Mondor, APHP, Créteil, France